

BEHANDLING MED BOTOX

Denne vejledning er lavet til dig, der ønsker at få foretaget en behandling med botox. Det er meget vigtigt, at du læser disse sider grundigt igennem inden behandlingen.

Forundersøgelse

Du kommer først til en forundersøgelse, hvor du fortæller om dit helbred og oplyser om eventuel medicin, du tager. Kirurgen vil vurdere dine rynker/furer og de områder, som du ønsker behandlet, og du vil blive grundigt informeret om indgrebet, forløbet samt mulige bivirkninger og komplikationer. Der tages billeder af det område, der skal behandles. Du vil tilmed få mulighed for at få besvaret alle de spørgsmål, du måtte have. Bemærk, at som Sundhedsstyrelsen foreskriver, skal der være en betænkningstid på 48 timer, før behandlingen kan foretages.

Forventninger

Som led i den naturlige aldringsproces opstår der ansigtsrynker i slutningen af 30'erne. Rynkerne opstår til dels som følge af manglende volumen og derudover som følge af påvirkning fra den mimiske ansigtsmuskulatur. Størstedelen af vores patienter kontakter os med ønsket om et "friskere look", og de fleste klager over enten rynker og linjer, mørke rande under øjnene eller at de ser trætte ud.

I tilfælde af, at man finder en operation med pandeløft/øjebrynsløft for stort et indgreb, så kan Botox i visse tilfælde give en tilsvarende virkning. Musklerne, der giver rynker over næsen og smilerynkerne ved øjnene, kan trække øjenbrynene ned, men efter at få indsprøjtet Botox i små doser afslappes musklerne, og øjenbrynene kan derved løftes. I store mængder er Botox et giftstof, men i de små mængder, som der anvendes her, anses det for at være uskadeligt, og det nedbrydes i kroppen. Botox hæmmer nerveimpulsen til de små mimiske muskler således, at de slapper af, og rynkerne udglattes.

Graviditet og amning

Husk at du ikke må være gravid eller amme, når du skal behandles med botox.

Før behandlingen

Såfremt at du i tidspunktet op til indgrebet føler dig utilpas såsom forkølelse, influenza eller andre symptomer, skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt, da indgrebet i visse tilfælde vil blive udsat. Det samme gælder, hvis du har sår, bumser og blå mærker i nærheden af det område, der skal behandles. Har du haft infektion i kroppen i ugen op til indgrebet, så bedes du tilmed kontakte klinikken.

Er der i øvrigt sket noget nyt, siden du har været til konsultation, er det bedre at kontakte klinikken for en sikkerheds skyld, da du ellers kan risikere, at indgrebet aflyses, når du møder op. Indgrebet betales ved ankomsten, og du bedes medbringe din vanlige medicin. Du vil blive undersøgt af behandleren, og alle former for make-up bedes du fjerne inden indgrebet. Undgå også cremer i ansigtet inden behandlingen.

Selve behandlingen

Behandlingen foretages med en ultratynd nål og er som oftest forbundet med let ubehag og kortvarig let smerte. Varighed af indgrebet er ca. 20-30 minutter.

Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på injektionen med let til moderat hævelse, rødme og ømhed. Denne reaktion forsvinder normalt efter et par dage. Man bør undgå at røre, trykke og gnide på området i 6 timer efter behandlingen. Du bør tilmed undgå at ligge ned 4 timer efter behandlingen.

Creme og sollys

Vi anbefaler, at du venter et par dage med at bruge creme, olie og make-up i det behandlede område. Du bør tilmed vente et par dage med at udsætte det behandlede område for sollys og kulde.

Arbejde

Du kan genoptage dit arbejde allerede kort tid efter behandlingen med botox - du skal blot være opmærksom på, at der kan forekomme blå mærker og hævelse, som vil være synligt.

Hvor længe holder effekten af botox?

Effekten ses efter 1-2 dage, og den fulde effekt ses efter et par uger. Effekten aftager og kan gentages efter 3-6 måneder - dog kan man i nogle tilfælde se en permanent svækkelse af musklerne. Ved gentagne behandlinger forlænges effektens varighed som oftest.

Bivirkninger

Lokal ømhed, smerter og hævelse. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme infektion eller forbigående symptomer i form af hovedpine, synsforstyrrelser, hængende øjenbryn, hævede eller hængende øjenlåg, tørre øjne, let kvalme eller en allergisk reaktion. Ekstremt sjældent kan der forekomme forbigående lammelse af ansigtsmuskulaturen i det behandlede område. I tilfælde af problemer bør klinikken altid kontaktes. Ved tidligere overfølsomhedsreaktioner ved denne behandling, ved graviditet eller infektion i området bør behandlingen udsættes.

Kontrol

Der aftales ikke en rutinemæssig kontrol, men vi anbefaler, at du kommer til kontrol 2 uger efter behandlingen. Har du spørgsmål eller gener efter behandlingen, så kan du altid kontakte os og bestille en tid til en kontrol. Vi står altid til rådighed med rådgivning både før, under og efter behandlingen.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, så besvarer vi dem altid gerne, og vi ser dig også altid gerne til en ny kontrol eller konsultation uden beregning.

Ringstedgade 19, 4000 Roskilde
kontakt@roskildeprivathospital.dk
tlf.: 4632 5005